

NOROCILLIN LA ad us. vet., Injektionslösung

Langwirkendes Penicillin für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen

Zusammensetzung

Benzylpenicillinum benzathinum 150'000 U.I., Benzylpenicillinum procainum 150'000 U.I., Polysorbatum 80, Povidonum, Dinatrii edetas, Kalii dihydrogenophosphas, Natrii citras, Carmellosum natricum, Simethiconum. Conserv.: E218 1,5 mg, Aqua ad iniectabilia q.s. ad solutionem pro 1 ml.

Eigenschaften / Wirkungen

NOROCILLIN LA ist speziell für langdauernde Penicillin-Therapien indiziert, da die Anzahl Injektionen verringert werden kann.

Pharmakokinetik

Nach intramuskulärer Injektion werden die therapeutischen Blutspiegelwerte von Procain-Penicillin während ca. 24 Stunden, und diejenigen von Benzathin-Penicillin, welches nur langsam absorbiert wird, während **3 bis 4 Tagen** anhalten.

Indikationen

Therapie systemischer Infektionen verursacht durch oder assoziiert mit Penicillin-empfindlichen Organismen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen.

Dosierung / Anwendung

nur tief intramuskulär

- **Rinder, Schafe, Schweine:** 12'000 I.E. Penicillin / kg Körpergewicht (2 ml / 50 kg KG)
- **Hunde, Katzen:** 30'000 I.E. Penicillin / kg Körpergewicht (1 ml / 10 kg KG)

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikation: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Penicillin.

Vorsichtsmassnahmen: NOROCILLIN LA nicht intravenös injizieren.

Unerwünschte Wirkungen

Es können vorübergehende Fieberschübe, Erbrechen, Schüttelfrost, Apathie und Inkoordination, bei Jungsaugen und trächtigen Saugen auch Vaginalausfluss assoziiert mit Abort, auftreten.

Absetzfristen

- **Milch:** 8 Tage
- **essbares Gewebe:** 14 Tage

Wechselwirkungen

keine

Sonstige Hinweise

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Lichtgeschützt, bei Raumtemperatur (15 - 25°C) lagern.

Aufbrauchfrist nach erster Entnahme: 28 Tage.

Packungen

Flasche zu 100 ml

Hersteller

Norbrook, Newry, GB

Swissmedic: 48'708 (A)

ATCvet: 48'708