

Zusammensetzung

Acepromazinum 10 mg ut Acepromazini hydrogenomaleas, Aqua ad injectabilia ad 1 ml

Eigenschaften / Wirkungen

Acepromazin ist ein Phenothiazin, wirkt sedativ, hypnotisch, antiemetisch, und potenziert die Wirkung von Narkosemitteln.

Pharmakokinetik

Nach intravenöser Applikation von 1.3 - 1.5 mg / kg KG hält die pharmakologische Wirkung ca. 4 Stunden an. Die Eliminationshalbwertszeit ist nach intravenöser Applikation ca. 7 Stunden.

Indikationen

Zur Beruhigung von erregten, aggressiven oder widersetzlichen Tieren; Sedation bei tierärztlichen Untersuchungen, kleinen Eingriffen, zahnärztlichen Behandlungen; Prämedikation vor Allgemein-narkosen.

Dosierung / Anwendung

0.03 mg - 2mg / 10 kg KG, je nach gewünschter Sedationslänge subcutan, intramuskulär oder

langsam intravenös.

Hund

- **i.v.:** 0.05 ml / 10kg KG.
- **s.c., i.m.:** 0.1 ml / 10 kg KG

Katze

- **i.v.:** 0.05 – 0.1 ml / 10kg KG
- **s.c., i.m.:** 0.1 – 0.15 ml / 10 kg KG

Anwendungseinschränkungen

Nicht zu verwenden bei Tremorbehandlungen, die durch Phosphorester Vergiftungen verursacht sind, da ihre Toxizität durch Phenothiazine potenziert wird. Bei Patienten mit Leberfunktionstörungen und bei Krampfneigungen (Epilepsie) nur mit Vorsicht zu verwenden.

Unerwünschte Wirkungen

Mit Vorsicht zu verwenden bei Patienten unter Stress, im Schock, bei Hypovolämie oder Herzproblemen. Acepromazin wirkt blutdrucksenkend. Bei Hypotonie oder Überdosierung, Noradrenalin verabreichen. Auf Adrenalin-enthaltende respiratorische Analeptika verzichten. Unbeabsichtigte intracarotidale Injektion kann Desorientierung, Krämpfe und Tod verursachen. Es wird empfohlen bei der Prämedikation mit Acepromazin zusätzlich Atropin zu verabreichen, um der negativen Wirkung von Acepromazin auf den Vagus vorzubeugen.

Sonstige Hinweise

Das Produkt ist bis zu dem auf der Verpackung mit „Exp.“ angegebenen Verfalldatum zu verwenden. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Aufbrauchfrist nach erster Entnahme: 1 Monat. Lagerung: Licht geschützt, zwischen 15°C - 25°C

Packungen

Flasche zu 10 ml

Hersteller

Fatro S.p.A., Ozzano Emilia, I

Swissmedic: 56'719 (B)

ATCvet: QN05AA04